

Portafolio

Hematología y Hemofilia

COBO

m e d i c a l

Alianzas de
confianza

COBO

ÍNDICE

| | |
|---------------------------|---|
| Nuestros Servicios..... | 3 |
| Amgen | 5 |
| Baxalta | 5 |
| Bayer | 7 |
| GBT Grupo Biotoscana..... | 7 |
| CSL Behring | 8 |
| Novo Nordisk..... | 8 |
| Pfizer | 9 |
| Sanofi..... | 9 |

Hacemos de la distribución
de productos hospitalarios
y de la salud una actividad
**inspirada en el bienestar
de los pacientes**



NUESTROS SERVICIOS



Amplio portafolio de dispositivos
médicos y medicamentos



Atención de Lunes a Sábado todas las
semanas del año



Despachos a nivel nacional



Atención a urgencias vitales
y prioritarias



Inventarios de seguridad



Asesoría técnica para el personal
de salud



COBO pharmacy Droguería
especializada

COBO
medical

Portafolio

Hematología y Hemofilia

AMGEN

| NOMBRE COMERCIAL | PRINCIPIO ACTIVO | INDICACIONES |
|------------------|------------------|---|
| Nplate | Romiplostim | Indicado para el tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria (PTI) en pacientes adultos que son refractarios a otros tratamientos |

Baxalta

| NOMBRE COMERCIAL | PRINCIPIO ACTIVO | INDICACIONES |
|------------------|---|--|
| Advate | Factor VIII recombinante (Octocog alfa) | <p>Tratamiento y profilaxis de las hemorragias en pacientes con Hemofilia A (deficiencia congénita de factor VIII).</p> <p>Advate no contiene factor Von Willebrand en cantidades efectivas farmacológicamente y por lo tanto no está indicado para el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand.</p> |
| Adynovate | Rurioctocog alfa pegol | Adynovate®, Factor VIII Humano Recombinante PEGilado, es un factor antihemofílico humano indicado en pacientes niños o adultos con hemofilia A (deficiencia congénita de factor VIII) para: tratamiento a demanda y control de episodios de sangrado |
| Feiba | Proteína plasmática humana con actividad contra los inhibidores del factor VIII | Tratamiento y profilaxis de hemorragias y en intervenciones quirúrgicas en: pacientes con hemofilia tipo A con inhibidor del factor VIII Pacientes con hemofilia tipo B con inhibidor del factor IX |

Baxalta

NOMBRE COMERCIAL

PRINCIPIO ACTIVO

INDICACIONES

Hemofil

Factor VIII de coagulación humano

Profilaxis y tratamiento de la hemofilia a en la que este demostrada una deficiencia de la actividad del factor VIII. Tratamiento de inmunotolerancia inducida (sigla en inglés ITI).

Immunate

Factor viii (potencia), proteína factor AG von willebrand (promedio 190 UI/ 5 ml)

Profilaxis y tratamiento de sangrado en pacientes con hemofilia a (deficiencia congénita del factor VIII), deficiencia adquirida del factor VIII, profilaxis y tratamiento de sangrado en enfermedad de Von Willebrand. Tratamiento de inmunotolerancia inducida (sigla en inglés ITI)

Immunine

Factor IX humano

Immunine es usado para el tratamiento y profilaxis de la hemorragia asociada con la deficiencia congénita o adquirida del factor IX de coagulación, en pacientes con hemofilia tipo B.

Rixubis

Nonacog gamma rfix, factor IX de coagulación recombinante 500,0 UI

Rixubis (Factor IX de Coagulación (Recombinante)) es un factor antihemofílico indicado para: control y prevención de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia B. o Manejo perioperatorio en pacientes con hemofilia B. o Profilaxis de rutina para prevenir o reducir la frecuencia de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia B.



| NOMBRE COMERCIAL | PRINCIPIO ACTIVO | INDICACIONES |
|------------------|------------------|--|
| Xarelto | Rivaroxabán | Está indicado para el tratamiento de la embolia pulmonar |



| NOMBRE COMERCIAL | PRINCIPIO ACTIVO | INDICACIONES |
|------------------|-----------------------------------|--|
| Haemate | Factor VIII de coagulación humano | Enfermedad de von willebrand (vwd): profilaxis y tratamiento de una hemorragia o sangrado quirúrgico cuando el tratamiento con desmopresina (ddavp) es ineficaz o está contraindicado. |

CSL Behring
Biotherapies for Life™

| NOMBRE COMERCIAL | PRINCIPIO ACTIVO | INDICACIONES |
|------------------|--|---|
| Alburex | Proteína plasmática con al menos un 96% de albúmina humana | Restablecimiento y mantenimiento del volumen circulatorio, cuando se haya demostrado un déficit de volumen y el uso de un coloide se considere apropiado. |



| NOMBRE COMERCIAL | PRINCIPIO ACTIVO | INDICACIONES |
|---------------------|---|--|
| Novoseven rt | Factor de coagulación VIIa recombinante (eptacog alfa activado) | <p>Es usado en ciertos grupos de personas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si tiene hemofilia congénita y no responde de forma normal al tratamiento con los factores VIII o IX • Si tiene hemofilia adquirida • Si tiene deficiencia de Factor VII • Si tiene trombastenia de Glanzmann (un trastorno hemorrágico) y su enfermedad no se puede tratar de forma efectiva mediante transfusión de plaquetas, o si las plaquetas no están fácilmente disponibles. |
| Novoeight | Factor VII humano de coagulación (ADNR), turoctocog alfa recombinante | Tratamiento y profilaxis de hemorragias en pacientes con hemofilia A (deficiencia congénita del factor VIII). NovoEight® puede ser utilizado en todos los grupos etarios. |



| NOMBRE COMERCIAL | PRINCIPIO ACTIVO | INDICACIONES |
|------------------|--|---|
| Benefix | Nonacog Alfa - Factor IX | <p>Hemofilia tipo B</p> <p>Tratamiento y profilaxis de las hemorragias en pacientes con hemofilia B (deficiencia congénita de factor IX)</p> |
| Xyntha | Moroctocog alfa es un Factor VIII de coagulación | <p>Hemofilia tipo A</p> <p>Tratamiento y profilaxis de hemorragias en pacientes con hemofilia A (deficiencia congénita del factor VIII)</p> |



| NOMBRE COMERCIAL | PRINCIPIO ACTIVO | INDICACIONES |
|------------------|--------------------|--|
| Clexane | Enoxaparina sódica | <p>Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes sometidos a cirugía ortopédica o cirugía general, incluida la cirugía por cáncer, con un riesgo moderado o alto de tromboembolismo</p> |

COBO

m e d i c a l

Info@cobomedical.com

www.cobomedical.com

